

PROVA NON STRATTA

GESSENIA FELIX MALAPARTIDA


13-05-26



PROVA SCRITTA N. 1

Concorso infermieri

13 maggio 2026



Prova n. 1

1. Cosa sono i DPI?

- a. Soluzioni che eliminano i batteri
- b. Detergenti personali per la prevenzione di infezioni
- c. Dispositivi di protezione individuali
- d. Dispositivi di prevenzione infezioni

2. Il paziente eupnoico presenta...

- a. Difficoltà alla respirazione
- b. Aumento della frequenza respiratoria
- c. Normale ritmo respiratorio
- d. Assenza di attività respiratoria

3. Non fanno parte della formula leucocitaria...

- a. I linfociti
- b. I monociti
- c. Granulociti
- d. Gli eritrociti

4. Medline-Pubmed è:

- a. Una rivista cartacea di interesse infermieristico
- b. Una banca-dati elettronica di letteratura scientifica
- c. Un motore di ricerca di letteratura italiana
- d. Una rivista elettronica

5. La cianosi è dovuta a...

- a. Diminuita quantità di eritrociti nel sangue
- b. Diminuita ossigenazione del sangue
- c. Miopatia cronica
- d. Diminuita quantità di linfociti nel sangue

6. Quali sono le sequenze da seguire nelle fasi del processo di nursing:

- a. Accertamento, diagnosi infermieristica, pianificazione, attuazione degli interventi, valutazione
- b. Diagnosi infermieristica, accertamento, pianificazione, valutazione, attuazione degli interventi
- c. Pianificazione, valutazione, accertamento, diagnosi infermieristica, attuazione degli interventi
- d. Pianificazione, accertamento, valutazione, attuazione degli interventi, diagnosi infermieristica

7. Quale posizione deve assumere l'assistito durante la procedura del clistere evacuativo:

- a. Posizione prona
- b. Posizione laterale destra
- c. Posizione laterale sinistra (Posizione di Sims)
- d. Posizione supina

8. Per la prevenzione di infezioni delle vie urinarie in assistiti portatori di catetere vescicale è opportuno:

- a. Eseguire irrigazioni vescicali con antisettici e antibiotici
- b. Posizionare la sacca di raccolta al di sopra del livello della vescica
- c. Utilizzare sacche di raccolta a circuito chiuso
- d. Raccordare la sacca di raccolta al catetere solo in orari prestabiliti

9. La Glasgow Coma Scale valuta:

- a. Il livello di coscienza
- b. Il dolore
- c. Le lesioni da pressione
- d. La guarigione delle ferite

10. Il termine asepsi indica:

- a. Assenza di agenti patogeni
- b. Rimozione di gran parte degli agenti patogeni
- c. Presenza di agenti patogeni
- d. Assenza di qualunque organismo vivente

CW  

11. L'emocultura:

- a. Permette di valutare la temperatura corporea del paziente
- b. Offre una dimostrazione della presenza di brividi
- c. Evidenzia presenza di malattia cronica
- d. Permette di rilevare la presenza di batteri a livello ematico

12. Cosa si intende per bilancio idrico negativo:

- a. Sono stati assimilati più liquidi di quelli eliminati
- b. Il bilancio si chiude in pareggio
- c. Le perdite di liquidi sono superiori ai liquidi assimilati
- d. Il paziente ha manifestato un episodio di sudorazione profusa

13. Per disfagia si intende:

- a. Un disturbo digestivo
- b. Acidità gastrica con eruttazione
- c. Difficoltà nella deglutizione
- d. Aerofagia

14. Qual è la posizione corretta di una sacca di raccolta urine raccordata ad un catetere vescicale:

- a. Al disotto del livello della vescica
- b. A livello della vescica
- c. Al di sopra del livello della vescica
- d. Non è importante considerare il livello della vescica per il suo posizionamento

15. Secondo il Codice Deontologico l'infermiere agisce in base a:

- a. Livello di competenza
- b. Direttive della struttura sanitaria
- c. Propria disponibilità
- d. Direttive del medico

16. Cosa si intende per incontinenza urinaria:

- a. Perdita involontaria di urine
- b. Assenza di urine in vescica
- c. Produzione elevata di urine in assenza di assunzione di liquidi
- d. Incapacità di urinare spontaneamente

17. Quali sono gli item presi in considerazione dalla scala di Braden per valutare il rischio di insorgenza di lesioni da pressione

- a. Percezione sensoriale, umidità cutanea, attività, mobilità, nutrizione, frizione e scivolamento
- b. Percezione sensoriale, mobilità, nutrizione e frizione
- c. Stato mentale, condizioni fisiche generali
- d. Umidità e nutrizione

18. Quale di queste procedure è importante nella prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza

- a. Igiene delle mani
- b. Flussi d'aria laminari
- c. Nebulizzazione
- d. Raggi ultravioletti

19. In caso di persona in shock ipovolemico la posizione consigliata è:

- a. Posizione supina
- b. Posizione semiseduta
- c. Posizione laterale
- d. Posizione di Trendelenburg

20. Quale trattamento permette di regolare la composizione sanguigna in pazienti affetti da grave malattia renale:

- a. Emodialisi e dialisi peritoneale
- b. Nefrectomia
- c. Ematoma
- d. Nefrite e nefrosi

Quidd

- 21. In caso di paziente che manifesta brividi, cefalea e sensazione di calore durante una trasfusione di emazie è necessario:**
- Sospendere l'infusione, mantenere l'accesso venoso e informare il medico
 - Diminuire la velocità di infusione e rivalutare dopo 10-15 minuti
 - Rimuovere l'accesso venoso
 - Aumentare la velocità di infusione e monitorare la temperatura corporea
- 22. Per la rilevazione della pressione arteriosa a riposo, il paziente deve assumere la posizione:**
- Seduta, con il braccio all'altezza del cuore
 - In piedi, con il braccio all'altezza del cuore
 - Supina, con le gambe flesse
 - Come preferisce
- 23. Quando il colore delle urine si presenta sulle tonalità del rosa, possiamo parlare di:**
- Ematuria
 - Nicturia
 - Piuria
 - Stranguria
- 24. Come si definisce l'insieme di raccomandazioni di comportamento clinico, elaborato mediante un processo di revisione sistematica della letteratura e delle opinioni di esperti, con lo scopo di supportare i sanitari nello stabilire le modalità assistenziali più appropriate in una specifica situazione:**
- Linea guida
 - Protocollo
 - Procedura
 - Percorso clinico
- 25. In caso di edema polmonare il paziente può presentare:**
- Tosse con escreato schiumoso e rosato, dispnea, sibili
 - Prurito agli arti inferiori e sonnolenza
 - Mucose orali disidratate
 - Addome globoso
- 26. Cosa si intende per ipossia generalizzata:**
- Grave carenza di ossigeno che coinvolge l'intero organismo
 - Insufficiente apporto ematico in un distretto corporeo
 - Valori di Frequenza cardiaca al di sotto dei range di normalità
 - Valori di Pressione arteriosa al di sotto dei range di normalità
- 27. La nutrizione parenterale:**
- Viene somministrata per via intradermica
 - Viene somministrata attraverso sondino naso gastrico
 - Viene somministrata attraverso un accesso venoso
 - Viene somministrata per via orale
- 28. Quali possono essere le complicanze precoci post confezionamento di una tracheostomia:**
- Dislocazione e ostruzione della cannula, emorragia
 - Dislocazione della cannula e ipertensione polmonare
 - Dislocazione della cannula e ipertensione arteriosa
 - Afasia ricettiva
- 29. La scala Stratify di valutazione del rischio di caduta:**
- Dovrebbe essere rivalutata ogni qual volta si modifichino le condizioni del paziente
 - Dovrebbe essere rivalutata ogni due settimane
 - Dovrebbe essere rivalutata una volta al mese
 - Non deve essere rivalutata
- 30. Il termine dispnea indica:**
- Difficoltà respiratoria con sensazione di soffocamento e peso sul torace
 - Frequenza respiratoria al di sopra dei range di normalità
 - Frequenza respiratoria al di sotto dei range di normalità
 - Assenza di respiro dovuta ad un atto volontario

31. Si devono somministrare 50 mg di Seriplide per via endovenosa. Considerando che 1 fiala contiene 500 mg di Seriplide in 5 ml, quanti ml si devono somministrare:
- 0.5 ml
 - 1 ml
 - 2 ml
 - 2,5 ml
32. Quale di queste affermazioni è vera rispetto alla medicazione di una tracheostomia:
- Va eseguita una detersione con bastoncini cotonati sterili imbevuti di soluzione fisiologica sterile
 - La detersione deve avvenire con movimenti a zig zag
 - Le fascette di fissaggio vanno posizionate in maniera poco aderente alla tracheostomia
 - Le medicazioni utilizzate sono sempre sterili
33. Qual è il parametro principale da valutare per identificare rapidamente uno stato di ipossia in un paziente?
- Saturazione di ossigeno
 - Peso corporeo
 - Altezza
 - Colore degli occhi
34. Quale tra i seguenti è un segno tipico di ipoglicemia?
- Bradycardia e pelle secca
 - Sudorazione e tremori
 - Cute calda e arrossata
 - Ipertensione grave
35. Prima di somministrare un farmaco, l'infermiere deve verificare:
- Solo il nome del paziente
 - Solo la prescrizione medica
 - Identità del paziente, farmaco, dose, via e orario
 - Solo la data di nascita
36. Quale dispositivo viene utilizzato per misurare la saturazione di ossigeno?
- Sfigmomanometro
 - Pulsossimetro
 - Termometro
 - Glucometro
37. Quale tra questi materiali è considerato tagliente sanitario?
- Garza sterile
 - Catetere vescicale
 - Ago usato
 - Cerotto
38. Quale via di somministrazione garantisce un assorbimento più rapido?
- Orale
 - Intramuscolare
 - Endovenosa
 - Sottocutanea
39. Quale colore identifica generalmente il contenitore dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo?
- Blu
 - Nero
 - Giallo
 - Verde
40. Quale valore è generalmente considerato normale per la saturazione di ossigeno nell'adulto sano?
- 70-75%
 - 80-85%
 - 90-92%
 - 95-100%

PROVA STRATTA

YESSENIA FELIX MALPARTIDA

13-05-26

Yessenia

PROVA SCRITTA N. 2

Concorso infermieri

13 maggio 2026

W *Qu* *Ad*

Prova n. 2

1. **La medicazione di un accesso venoso centrale:**
 - a. È una procedura che va effettuata con guanti sterili
 - b. È una procedura che va effettuata con guanti monouso
 - c. È una procedura che va effettuata senza guanti
 - d. È una procedura effettuabile solo in sala operatoria
2. **Quale di questi esami ematochimici è indispensabile prima dell'esecuzione di una procedura di diagnostica per immagini con iniezione di mezzo di contrasto:**
 - a. Creatininemia
 - b. Ematocrito
 - c. Bilirubina diretta
 - d. Natremia
3. **Con il termine diuresi si indica:**
 - a. La quantità di urine prodotta nelle 24 ore
 - b. Un tipo di infezione delle vie urinarie
 - c. Una ostruzione delle vie urinarie
 - d. Una calcolosi renale
4. **Quali possono essere sintomi caratteristici della malattia di Parkinson in fase conclamata:**
 - a. Tremore, bradicinesia e rigidità
 - b. Cianosi, dispnea e ipercapnia
 - c. Afasia, balbuzie e ecolalia
 - d. Crisi comiziali e miocloniche
5. **Quali possono essere gli effetti collaterali del trattamento chemioterapico:**
 - a. Blocco neuromuscolare
 - b. Discinesie e movimenti atipici
 - c. Nausea, emesi e mucosite
 - d. Euforia e agitazione psicomotoria
6. **Le Infezioni correlate all'assistenza (ICA):**
 - a. Insorgono in occasione di un ricovero ospedaliero o nelle 48 ore successive alle dimissioni
 - b. Sono causate da patogeni acquisiti al domicilio
 - c. Possono essere contratte in zone affollate
 - d. Possono colpire solo le vie urinarie
7. **La nutrizione enterale prevede:**
 - a. Somministrazione di nutrienti tramite accesso venoso periferico
 - b. Somministrazione di nutrienti attraverso accesso venoso centrale
 - c. Somministrazione di nutrienti per via sottocutanea
 - d. Somministrazione di nutrienti attraverso sondino nasogastrico o PEG
8. **I DPI:**
 - a. Servono a garantire la sicurezza del paziente
 - b. Servono a garantire la sicurezza dell'operatore
 - c. Servono a garantire la sicurezza della struttura
 - d. Sostituiscono il lavaggio delle mani
9. **le vie di somministrazione dei farmaci NON comprendono:**
 - a. venosa e percutanea
 - b. orale e intradermica
 - c. intramuscolare, endovenosa
 - d. intraungueale
10. **il nome commerciale di un farmaco:**
 - a. corrisponde sempre al principio attivo
 - b. può non corrispondere al principio attivo
 - c. indica la sostanza contenuta
 - d. indica un farmaco generico

11. La scala di valutazione del dolore VAS è una scala:

- a. Visivo-analogica
- b. Intervallare
- c. Colorimetrica
- d. Algoritmica

12. Per valutare la glicemia capillare, le sedi più usate sono:

- a. Dita dei piedi
- b. Polpastrelli delle dita
- c. Zona addominale
- d. Zona ventre-glutea

13. Con il termine tachicardia si intende:

- a. Diminuzione della frequenza cardiaca
- b. Diminuzione del flusso ematico
- c. Aumento della frequenza cardiaca
- d. Aumento del flusso ematico

14. In base al principio di funzionamento, i drenaggi esterni si distinguono in:

- a. Venoso e arterioso
- b. Toracico e addominale
- c. Cerebrale o meningeo
- d. Caduta ed aspirazione

15. Con il termine oliguria si intende:

- a. Una aumentata produzione di urina con escrezione di un volume maggiore a 1500 ml nelle 24 ore
- b. Una ridotta produzione di urina con escrezione di un volume inferiore a 500 ml nelle 24 ore
- c. Una ridotta produzione di urina con escrezione di un volume inferiore a 50 ml nelle 24 ore
- d. Una aumentata produzione di urina con escrezione di un volume maggiore di 3000 ml nelle 24 ore

16. Quale scala viene utilizzata per la valutazione del rischio caduta:

- a. Stratify
- b. Braden
- c. VAS
- d. Glasgow

17. Per prevenire l'insorgere di lesioni da pressione è necessario:

- a. Evitare le variazioni di decubito del paziente
- b. Trascinare il paziente sulle lenzuola durante il Cambio del letto
- c. Ridurre al minimo la frizione e lo scivolamento sulla superficie di appoggio della cute
- d. Lavaggio delle mani dell'operatore

18. L'aritmia si configura come:

- a. Un disturbo d'ansia
- b. Un disturbo della minzione
- c. Un disturbo del linguaggio
- d. Un disturbo del ritmo cardiaco

19. Il tenesmo vescicale:

- a. È una emissione involontaria di urine durante la notte
- b. È l'assenza o la ridotta emissione di urine nelle 24 ore
- c. È uno stimolo nervoso all'emissione di urina con scarse quantità
- d. È una contrazione involontaria spesso dolorosa della vescica con difficoltà nell'emissione di urina

20. Quale tra le seguenti NON è una sede di rilevazione della temperatura corporea:

- a. Ascellare
- b. Auricolare
- c. Rettale
- d. Sottomammaria

W CQ AD


- 21. Una immobilizzazione prolungata può provocare:**
- Aumento dell'appetito
 - Miglioramento del tono dell'umore
 - Aumento della peristalsi
 - Ridotta espansione polmonare e aumento del rischio di sviluppo di lesioni da pressione
- 22. Quali tra i seguenti principi attivi è un diuretico:**
- Paracetamolo
 - Morfina cloridrato
 - Furosemide
 - Cortisone
- 23. Nel cvc tipo Port a Cath è importante che paziente e caregiver siano educati a:**
- Non toccare la zona di impianto
 - Eseguire lavaggi con eparina
 - Non eseguire l'igiene della cute in sede di impianto
 - Riconoscere segni e sintomi di infezioni
- 24. Qual è il segno/sintomo principale di un paziente con occlusione intestinale**
- Rettoragia
 - Proctoragia
 - Alvo chiuso a feci e gas
 - Sincope
- 25. Quali delle seguenti sostanze è un disinfettante:**
- Ringer lattato
 - Soluzione fisiologica
 - Glucosata al 5%
 - Clorexidina
- 26. Quale tra le seguenti malattie può essere trasmessa per via ematogena:**
- Epatite C
 - Malaria
 - Influenza
 - Covid 19
- 27. L'hospice è un servizio:**
- Dedicato ai pazienti con malattie neurodegenerative
 - Dedicato ai pazienti geriatrici
 - Dedicato ai pazienti terminali
 - Dedicato ai pazienti affetti da dipendenze (alcool, sostanze stupefacenti)
- 28. L'infermiere nella valutazione del dolore deve:**
- Chiedere al paziente il livello di dolore percepito solo al momento dell'accettazione in reparto
 - Somministrare la terapia antidolorifica ad orari
 - Somministrare farmaci al bisogno
 - Prevenire, rilevare e documentare il dolore nel percorso di cura
- 29. Quali tra questi è un mezzo contenitivo:**
- Fascia anti scivolamento
 - Accesso venoso
 - Carrozzina
 - Deambulatore
- 30. Con il termine fistola si intende:**
- Un tumore benigno del tessuto connettivo
 - Un tumore maligno del tessuto osseo
 - Una raccolta di sangue nei tessuti circostanti la ferita
 - Un condotto anomalo che si forma fra due organi o fra un organo e l'esterno del corpo

31. Un paziente ha in corso una infusione di soluzione glucosata al 5 % alla velocità di 100 ml/h. Quanti millilitri di soluzione glucosata al 5% vengono somministrati in 24 ore?
- 2400 ml
 - 3000 ml
 - 800 ml
 - 1000 ml
32. Per eseguire correttamente un elettrocardiogramma a 12 derivazioni, dove occorre posizionare l'Elettrodo periferico verde:
- Arto superiore sinistro
 - Arto superiore destro
 - Arto inferiore destro
 - Arto inferiore sinistro
33. Quale strumento si usa per misurare la glicemia capillare?
- Pulsossimetro
 - Elettrocardiografo
 - Glucometro
 - Defibrillatore
34. Una corretta identificazione del paziente riduce il rischio di:
- Errori terapeutici
 - Disidratazione
 - Ipotermia
 - Sonnolenza
35. Quale tra questi è un segno possibile di disidratazione?
- Edema generalizzato
 - Cute secca e mucose asciutte
 - Bradipnea
 - Aumento della salivazione
36. La raccolta delle urine delle 24 ore richiede:
- Eliminazione della prima urina e raccolta delle successive
 - Solo il campione del mattino
 - Solo un campione casuale
 - Raccolta dopo i pasti
37. L'uso dei guanti monouso sostituisce il lavaggio delle mani?
- Sempre
 - Mai
 - Solo in reparto chirurgico
 - Solo con pazienti infettivi
38. Quale parametro viene valutato nella scala del dolore numerica (NRS)?
- Intensità del dolore
 - Frequenza cardiaca
 - Livello di coscienza
 - Temperatura corporea
39. Quale segno può indicare un'infezione della ferita chirurgica?
- Cute fredda
 - Arrossamento e secrezione
 - Pallore improvviso
 - Riduzione della temperatura locale
40. In presenza di arresto cardiaco, quale procedura deve essere attivata immediatamente?
- Mobilizzazione passiva
 - Nutrizione enterale
 - Rianimazione cardiopolmonare
 - Cateterismo vescicale

PROVA NON STRATTA

YESSENIA FELIX MALPARTIDA

13-05-26



PROVA SCRITTA N. 3

Concorso infermieri

13 maggio 2026



0

Prova n. 3

1. La medicazione di un accesso venoso centrale:

- a. È una procedura che va effettuata con guanti sterili
- b. È una procedura che va effettuata con guanti monouso
- c. È una procedura che va effettuata senza guanti
- d. È una procedura effettuabile solo in sala operatoria

2. Il paziente eupnoico presenta...

- a. Difficoltà alla respirazione
- b. Aumento della frequenza respiratoria
- c. Normale ritmo respiratorio
- d. Assenza di attività respiratoria

3. Con il termine diuresi si indica:

- a. La quantità di urine prodotta nelle 24 ore
- b. Un tipo di infezione delle vie urinarie
- c. Una ostruzione delle vie urinarie
- d. Una calcolosi renale

4. Scopus è:

- a. Una rivista cartacea di interesse infermieristico
- b. Una banca-dati elettronica di letteratura scientifica
- c. Un motore di ricerca di letteratura italiana
- d. Una rivista elettronica

5. Quali possono essere gli effetti collaterali del trattamento chemioterapico:

- a. Blocco neuromuscolare
- b. Discinesie e movimenti atipici
- c. Nausea, emesi e mucosite
- d. Euforia e agitazione psicomotoria

6. Quali sono le sequenze da seguire nelle fasi del processo di nursing:

- a. Accertamento, diagnosi infermieristica, pianificazione, attuazione degli interventi, valutazione
- b. Diagnosi infermieristica, accertamento, pianificazione, valutazione, attuazione degli interventi
- c. Pianificazione, valutazione, accertamento, diagnosi infermieristica, attuazione degli interventi
- d. Pianificazione, accertamento, valutazione, attuazione degli interventi, diagnosi infermieristica

7. La nutrizione enterale prevede:

- a. Somministrazione di nutrienti tramite accesso venoso periferico
- b. Somministrazione di nutrienti attraverso accesso venoso centrale
- c. Somministrazione di nutrienti per via sottocutanea
- d. Somministrazione di nutrienti attraverso sondino nasogastrico o PEG

8. Per la prevenzione di infezioni delle vie urinarie in assistiti portatori di catetere vescicale è opportuno:


- a. Eseguire irrigazioni vescicali con antisettici e antibiotici
- b. Posizionare la sacca di raccolta al di sopra del livello della vescica
- c. Utilizzare sacche di raccolta a circuito chiuso
- d. Raccordare la sacca di raccolta al catetere solo in orari prestabiliti

9. Le vie di somministrazione dei farmaci NON comprendono:

- a. venosa e sottocutanea
- b. orale e intradermica
- c. intramuscolare ed endovenosa
- d. intraungueale

10. la sterilizzazione si avvale dei seguenti metodi:

- a. vapore
- b. perossido di idrogeno
- c. ossido di etilene
- d. tutte le risposte sono corrette



11. La scala di valutazione del dolore VAS è una scala:

- a. Visivo-analogica
- b. Intervallare
- c. Colorimetrica
- d. Algoritmica

12. Cosa si intende per bilancio idrico negativo:

- a. Sono stati assimilati più liquidi di quelli eliminati
- b. Il bilancio si chiude in pareggio
- c. Le perdite di liquidi sono superiori ai liquidi assimilati
- d. Il paziente ha manifestato un episodio di sudorazione profusa

13. Con il termine bradicardia si intende:

- a. Diminuzione della frequenza cardiaca
- b. Diminuzione del flusso ematico
- c. Aumento della frequenza cardiaca
- d. Aumento del flusso ematico

14. Le stomie intestinali sono classificabili in funzione di:

- a. Porzione di intestino coinvolta
- b. Segmento di stomaco coinvolto
- c. Tipo di alimentazione del paziente
- d. Tipo di attività fisica svolta dal paziente

15. Con il termine oliguria si intende:

- a. Una aumentata produzione di urina con escrezione di un volume maggiore a 1500 ml nelle 24 ore
- b. Una ridotta produzione di urina con escrezione di un volume inferiore a 500 ml nelle 24 ore
- c. Una ridotta produzione di urina con escrezione di un volume inferiore a 30 ml nelle 24 ore
- d. Una aumentata produzione di urina con escrezione di un volume maggiore di 3000 ml nelle 24 ore

16. Cosa si intende per incontinenza urinaria:

- a. Perdita involontaria di urine
- b. Assenza di urine in vescica
- c. Produzione elevata di urine in assenza di assunzione di liquidi
- d. Incapacità di urinare spontaneamente

17. Per prevenire l'insorgere di lesioni da pressione è necessario:

- a. Evitare le variazioni di decubito del paziente
- b. Trascinare il paziente sulle lenzuola durante il cambio del letto
- c. Ridurre al minimo la frizione e lo scivolamento sulla superficie di appoggio della cute
- d. Lavaggio delle mani dell'operatore

18. Quale di queste procedure è importante nella prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza

- a. Igiene delle mani
- b. Flussi d'aria laminari
- c. Nebulizzazione
- d. Raggi ultravioletti

19. Il tenesmo vescicale:

- a. È una emissione involontaria di urine durante la notte
- b. È l'assenza o la ridotta emissione di urine nelle 24 ore
- c. È uno stimolo nervoso all'emissione di urina con scarse quantità
- d. È una contrazione involontaria spesso dolorosa della vescica con difficoltà nell'emissione di urina

20. Quale trattamento permette di regolare la composizione sanguigna in pazienti affetti da grave malattia renale:

- a. Emodialisi e dialisi peritoneale
- b. Nefrectomia
- c. Ematoma
- d. Nefrite e nefrosi

- 21. Una immobilizzazione prolungata può provocare:**
- Aumento dell'appetito
 - Miglioramento del tono dell'umore
 - Aumento della peristalsi
 - Ridotta espansione polmonare e aumento del rischio di sviluppo di lesioni da pressione
- 22. Per la rilevazione della pressione arteriosa a riposo, il paziente deve assumere la posizione:**
- Seduta, con il braccio all'altezza del cuore
 - In piedi, con il braccio all'altezza del cuore
 - Supina, con le gambe flesse
 - Come preferisce
- 23. Nel cvc tipo Port a Cath è importante che paziente e caregiver siano educati a:**
- A non effettuare nessuna indicazione
 - Eseguire lavaggi con eparina
 - Non eseguire l'igiene della cute in sede di impianto
 - Riconoscere segni e sintomi di infezioni
- 24. Come si definisce l'insieme di raccomandazioni di comportamento clinico, elaborato mediante un processo di revisione sistematica della letteratura e delle opinioni di esperti, con lo scopo di supportare i sanitari nello stabilire le modalità assistenziali più appropriate in una specifica situazione:**
- Linea guida
 - Protocollo
 - Procedura
 - Percorso clinico
- 25. Quali delle seguenti sostanze è un disinfettante:**
- Ringer lattato
 - Soluzione fisiologica
 - Glucosata al 5%
 - Clorexidina
- 26. Cosa si intende per ipossia generalizzata:**
- Grave carenza di ossigeno che coinvolge l'intero organismo
 - Insufficiente apporto ematico in un distretto corporeo
 - Valori di Frequenza cardiaca al di sotto dei range di normalità
 - Valori di Pressione arteriosa al di sotto dei range di normalità
- 27. L'hospice è un servizio:**
- Dedicato ai pazienti con malattie neurodegenerative
 - Dedicato ai pazienti geriatrici
 - Dedicato ai pazienti terminali
 - Dedicato ai pazienti affetti da dipendenze (alcol, sostanze stupefacenti)
- 28. Quali possono essere le complicanze precoci post confezionamento di una tracheostomia:**
- Dislocazione e ostruzione della cannula, emorragia
 - Dislocazione della cannula e ipertensione polmonare
 - Dislocazione della cannula e ipertensione arteriosa
 - Afasia ricettiva
- 29. Quali tra questi è un ausilio per la mobilizzazione/deambulazione:**
- Materasso antidecubito
 - Accesso venoso
 - Urocondom
 - Deambulatore tipo walker
- 30. Il termine disfagia indica:**
- Difficoltà respiratoria con sensazione di soffocamento e peso sul torace
 - Difficoltà nella deglutizione
 - Blocco intestinale
 - Assenza di rumori intestinali

- 31. Per eseguire correttamente un elettrocardiogramma a 12 derivazioni, dove occorre posizionare l'Elettrodo periferico verde:**
- Arto superiore sinistro
 - Arto superiore destro
 - Arto inferiore destro
 - Arto inferiore sinistro
- 32. Si devono somministrare mezza fiala di Ampicillina da 1 gr, quanti mg verranno somministrati**
- 500 mg
 - 400 mg
 - 250 mg
 - 300 mg
- 33. La documentazione infermieristica deve essere:**
- Generica e sintetica
 - Compilata solo a fine turno
 - Chiara, completa e tempestiva
 - Facoltativa
- 33. La tachicardia nell'adulto è definita da una frequenza cardiaca:**
- Inferiore a 40 bpm
 - Superiore a 100 bpm
 - Inferiore a 60 bpm
 - Uguale a 50 bpm
- 35. Quale scala viene comunemente utilizzata per valutare il rischio di lesioni da pressione?**
- Scala di Glasgow
 - Scala di Braden
 - Scala di Norton solo pediatrica
 - Scala APGAR
- 36. La cianosi indica generalmente:**
- Eccesso di calcio
 - Ridotta ossigenazione del sangue
 - Disidratazione lieve
 - Aumento della glicemia
- 37. Quale tra questi è un corretto dispositivo di protezione individuale (DPI)?**
- Cartella clinica
 - Fonendoscopio
 - Mascherina chirurgica
 - Saturimetro
- 38. La bradipnea indica:**
- Aumento della frequenza respiratoria
 - Riduzione della frequenza respiratoria
 - Assenza totale di respiro
 - Tosse persistente
- 39. La scala di Glasgow serve a valutare:**
- Il rischio nutrizionale
 - Lo stato di coscienza
 - Il dolore toracico
 - La funzione renale
- 40. Una ferita con margini arrossati, dolore e secrezione può essere:**
- In fase di completa guarigione
 - Infetta
 - Cicatrizzata
 - Non valutabile

