



Risonanza magnetica - A cosa serve nella diagnosi - In breve

Da dove sono prese queste informazioni?

Da linee guida e raccomandazioni di esperti riportate nelle pubblicazioni:

- Diagnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions of the McDonald criteria. *Lancet Neurol* 2018;17:162-73.
- MAGNIMS consensus guidelines on the use of MRI in multiple sclerosis-clinical implementation in the diagnostic process. *Nat Rev Neurol*. 2015;11:471-82.
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Management of multiple sclerosis in primary and secondary care. NICE clinical guideline 186. October 2014.
- Guidelines from The Italian Neurological and Neuroradiological Societies for the use of magnetic resonance imaging in daily life clinical practice of multiple sclerosis patients. *Neurol Sci* 2013; 34:2085-93.
- Diagnostic Criteria for Multiple Sclerosis: 2010 Revisions to the "McDonald Criteria". *Annals of Neurology* 2011;69:292-302.
- Recommended Diagnostic Criteria for Multiple Sclerosis: Guidelines from the International Panel on the Diagnosis of Multiple Sclerosis. *Ann Neurol* 2001;50:121–7.

Come si valuta la qualità di una linea guida

Le linee guida sono raccomandazioni sul trattamento, la terapia o il farmaco appropriati per una specifica condizione o malattia, e sull'assistenza sanitaria di persone con specifiche malattie o condizioni di rischio. Sono basate sulla revisione sistematica delle migliori evidenze disponibili; si propongono come aiuto ai professionisti sanitari, ma non ne sostituiscono il sapere e le capacità, e alle persone con malattia.

Possono essere prodotte da gruppi di esperti, società scientifiche, o da enti pubblici (per esempio il Sistema nazionale linee guida dell'Istituto superiore di sanità in Italia, il National Institute for Health and Care Excellence (NICE) nel Regno Unito).

Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation è il riferimento internazionale per la valutazione delle linee guida, molto utilizzato a livello internazionale e validato nella ricerca e nella pratica clinica. Si tratta di una scheda che considera 6 aree o dimensioni: obiettivi e ambiti di applicazioni della linea guida, coinvolgimento dei portatori di interesse (per esempio medici, persone con la malattia, decisori sanitari, amministratori...), rigore metodologico con cui sono state definite le raccomandazioni, chiarezze espositiva, applicabilità delle raccomandazioni, indipendenza editoriale di chi ha prodotto la linea guida. Ogni dimensione ha diverse voci, ciascuna con relativi punteggi. La scheda viene di solito applicata alla singola linea guida da due persone (revisori) in modo indipendente. Ciascun revisore dà un punteggio a ciascuna voce della scheda. Il punteggio finale è un calcolo dei punteggi dei due revisori.

[QUESTIONI DI METODO](#)

Data aggiornamento: maggio 2019