

SE HAI QUESTI SINTOMI DILLO AL NEUROLOGO

La classi di frequenza in cui sono presentati gli effetti collaterali sono: molto comune, comune, non comune.

Molto comune: su 10 persone che prendono il farmaco, da una a 10 possono avere l'effetto collaterale indicato (in percentuale, dal 10% al 100%).

Comune: su 100 persone che prendono il farmaco, da una a 9 possono avere l'effetto collaterale indicato (in percentuale, dall' 1% al 9%).

Non comune: su 1.000 persone che prendono il farmaco, da una a 9 possono avere l'effetto collaterale indicato (in percentuale, dallo 0,1% allo 0,9%).

Questi numeri esprimono una stima della frequenza degli effetti collaterali, indicano una probabilità.

Sintomi - Avonex® A Rebif® R Betaferon® B

| | Molto comune | Comune | Non comune |
|---|--------------|--------|------------|
| febbre, brividi, tosse, mal di gola, sudorazione come quando si ha l'influenza nelle ore successive alla somministrazione, soprattutto per i primi mesi | ARB | | |
| mal di testa | ARB | | |
| dolore e infiammazione nella sede dell'iniezione | RB | A | |
| debolezza, senso di affaticamento (astenia) | B | AR | |
| prurito, rash | | AR | B |
| nausea, vomito, diarrea | | AR | B |
| depressione, insonnia | | R | B |
| dolori muscolari e articolari | | AR | |
| necrosi nella sede di iniezione | | B | R |
| anoressia | | A | |
| perdita di capelli (alopecia) | | | ARB |
| ipertensione | | | B |

Esami del sangue - Avonex® A Rebif® R Betaferon® B

| | Molto comune | Comune | Non comune |
|---|--------------|--------|------------|
| riduzione dei globuli bianchi | R | A | B |
| riduzione dei globuli rossi | R | A | B |
| riduzione delle piastrine | R | | AB |
| livello enzimi del fegato fuori norma | R | | B |
| alterazione degli ormoni della tiroide (iper - ipotiroidismo) | | | R |